

## SCHEDA RILIEVO SPEDITIVO PRATI DONATORI

Serie/Progetto **GEBIODIV – WP3 e WP4**  
 Compilatore **Magillo Francesca**

Stazione **AQUILA**  
 Data **14/06/22**

### LOCALIZZAZIONE E ACCESSO

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Quota (m)          | 750 |
| Asfalto            |     |
| Sterrata           |     |
| Pista trattorabile | 80m |
| Sentiero           |     |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Comune           | Aquila d'Arroscia                   |
| Località         | San Giacomo                         |
| Stima estensione | 1000-5000 mq                        |
| Qualità accesso  | Ottima                              |
| Proprietà        | Comune di Aquila d'Arroscia (parte) |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                   |    |
|-------------------|----|
| Alt.erbe (cm)     | 20 |
| Copertura %       | 90 |
| Tare rocce/pietre | 15 |
| Tare terra/muschi | 10 |
| Pendenza          | 20 |
| Esposizione       | E  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tipo vegetazione     | Pascolo                              |
| Facies pastorale     | 8.02 Bromus er, Carex hum e Fest. ov |
| Habitat Natura2000   | 6210 prioritario                     |
| Specie emergenti     | Orchidee (ved. note)                 |
| Specie problematiche | <i>Cuscuta epithymum</i>             |
| Litologia            | Flysch calcareo-marnosi              |

### SPECIE PREVALENTI

#### Graminoidi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Copertura %         | 60 |
| Rispetto cop.totale | 67 |

|   | STAB | FIOR | ISVP | Abb. | Ord. |
|---|------|------|------|------|------|
| <i>Bromopsis erecta (=Bromus erectus)</i> | 3    | 0    | 1,5  | >    | 1    |
| <i>Festuca ovina s.l.</i>                 | 3    | 0    | 1,5  |      |      |
| <i>Carex humilis</i>                      | 3,5  | 0    | 0    |      | 2    |
| <i>Koeleria macrantha</i>                 | 2,5  | 0    | 1    | <    |      |
| <i>Briza minor</i>                        |      | 0    | 1    | <    |      |
|   | 6,0  | 0,0  | 2,0  |      |      |

#### Leguminose

|                     |    |
|---------------------|----|
| Copertura %         | 10 |
| Rispetto cop.totale | 11 |

|                             |     |     |     |   |   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| <i>Hippocrepis comosa</i>   | 3   | 3   | 1   | > | 5 |
| <i>Lotus dorycnium</i>      |     | 3   | 2   |   |   |
| <i>Trifolium montanum</i>   | 3   | 3   | 3   |   |   |
| <i>Medicago lupulina</i>    | 2   | 1   | 2   | < |   |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | 3   | 3   | 2   | < |   |
|                             | 5,5 | 5,2 | 4,0 |   |   |

#### Altre specie

|                     |    |
|---------------------|----|
| Copertura %         | 20 |
| Rispetto cop.totale | 22 |

|  |     |     |     |   |   |
|--|-----|-----|-----|---|---|
| <i>Linum cfr. usitatissimum</i>            |     | 4   | 0   | > | 3 |
| <i>Fumana procumbens</i>                   | 2   | 3   | 0   |   | 4 |
| <i>Galium corrudifolium</i>                | 2   | 4   | 0   |   |   |
| <i>Poterium sanguisorba (=Sanguisorba)</i> | 4   | 2   | 1   |   |   |
| <i>Scabiosa pyrenaica</i>                  | 3,5 | 5   | 0   |   |   |
| <i>Euphrasia stricta</i>                   | 1   | 3   | 0   |   |   |
| <i>Linum strictum</i>                      |     | 2   | 0   |   |   |
| <i>Thesium linophyllum</i>                 |     | 2   | 0   |   |   |
| <i>Allium sphaerocephalon</i>              | 1   | 3   | 0   | < |   |
| <i>Potentilla verna (=neumanniana)</i>     |     | 3   | 0   | < |   |
|  | 4,5 | 6,2 | 0,2 |   |   |

**INDICI**    **5,6**    **3,9**    **1,8**

NOTE: brucato da lepri (escrementi). Orchidee: *Ophrys bertolonii subsp. benacensis* (fioritura piuttosto abbondante), *Anacamptis morio*, *Neotinea tridentata*