

SCHEDA RILIEVO SPEDITIVO PRATI DONATORI

	INNATURA – Innovazione scientifica, culturale e tecnologica per conoscere e gestire la Rete Natura	Stazione	7		
Compilatore	Turcato C., Dagnino D	Data	20.05.2025		

LOCALIZZAZIONE E ACCESSO					
Quota (m)	842	Comune	Casarza Ligure		
Asfalto		Località	Lago di Bargone		
Sterrata	8400 m	Stima estensione	0-500 mq		
Pista trattorabile		Qualità accesso	scarsa		
Sentiero	200 m	Proprietà	privata		

CARATTERISTICHE GENERALI					
Alt.erbe (cm)	20	Tipo vegetazione	pascolo semiarido		
Copertura %	98	Facies pastorale	non disponibile		
Tare rocce/pietre	1	Habitat Natura2000	6210		
Tare terra/muschi	1	Specie emergenti	orchidacee, Crocus ligusticus		
Pendenza	0	Specie problematiche	-		
Esposizione	-	Litologia	serpentiniti		

SPECIE PREVALENTI		STAB	FIOR	ISVP	Abb.	Ord.	
Graminoidi	Brachypodium genuense	3	0	1	>	1	
	Poa pratensis subsp. pratensis	2.5	0	3	>	2	
	Copertura %	87	Festuca rubra subsp. rubra	2.5	0	2	3
	Rispetto cop.totale	95	Festuca ovina	3	0	1.5	
		Agrostis capillaris subsp. capillaris	3	0	2		
		5.6	0.0	3.8			
Leguminose	Trifolium pratense subsp. pratense	2.5	4	4		4	
	Lotus corniculatus subsp. corniculatus	4	3	2			
	Copertura %	6	Trifolium dubium	1.5	1	1	<
	Rispetto cop.totale	5					
			5.3	5.3	4.7		
Altre specie	Galium verum subsp. verum	3	4	0		5	
	Ranunculus bulbosus	1.5	3	0			
	Copertura %	10	Achillea tomentosa	2	4	1	
	Rispetto cop.totale	9	Centaurea jacea	4	4	0	
		Crocus ligusticus	1	3	0		
		Thymus pulegioides	3	3	0		
		Veronica officinalis	1.5	2	0		
		Cerastium ligusticum	1	1	0		
		Ophioglossum vulgatum	1	0	0		
		Knautia sp.	3.5	5	1		
			4.3	5.8	0.4		
INDICI		5.5	1.4	3.6			

NOTE: Spazzolatrice a spalla: idoneo; Spazzolatrice a spinta: non idoneo; Spazzolatrice a trattice: non idoneo. Il sito è pascolato tutto l'anno da equini: per l'utilizzo come prato donatore occorre evitare il pascolo per almeno 3 mesi in periodo vegetativo prima della raccolta del fiorume.

