

# SCHEDA RILIEVO SPEDITIVO PRATI DONATORI

Serie/Progetto **GEBIODIV – WP3 e WP4**  
 Compilatore **Magillo Francesca**

Stazione **SBERN**  
 Data **14/06/22**

## LOCALIZZAZIONE E ACCESSO

|                  |      |
|------------------|------|
| Quota (m)        | 1080 |
| Asfalto          | X    |
| Sterrata         |      |
| Pista trattabile |      |
| Sentiero         |      |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Comune           | Armo                     |
| Località         | Cappella di San Bernardo |
| Stima estensione | 1000-5000 mq             |
| Qualità accesso  | Ottima                   |
| Proprietà        | Parrocchia di Armo       |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Alt.erbe (cm)     | 80  |
| Copertura %       | 100 |
| Tare rocce/pietre | 0   |
| Tare terra/muschi | 0   |
| Pendenza          | 5   |
| Esposizione       | NE  |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipo vegetazione     | Prato a sfalcio                           |
| Facies pastorale     | 8.07 Onobr. viciif, Bromus er, Fest. rub. |
| Habitat Natura2000   | 6210 con caratteri di 6510                |
| Specie emergenti     | <i>Gymnadenia conopsea</i>                |
| Specie problematiche | <i>Asphodelus albus</i> (poche piante)    |
| Litologia            | Flysch argillitici                        |

## SPECIE PREVALENTI

### Graminoidi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Copertura %         | 60 |
| Rispetto cop.totale | 60 |

|                                                | STAB | FIOR | ISVP | Abb. | Ord. |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <i>Bromopsis erecta</i> (=Bromus erectus)      | 3    | 0    | 1,5  | >    | 1    |
| <i>Festuca gr. rubra</i>                       | 2,5  | 0    | 2,5  |      | 2    |
| <i>Cynosurus cristatus</i>                     | 1,5  | 0    | 1    |      | 3    |
| <i>Agrostis capillaris</i> (=A. tenuis)        | 3    | 0    | 2    |      | 5    |
| <i>Trisetaria flavescens</i> (=Trisetum flave) | 2    | 0    | 2    |      |      |
|                                                | 4,8  | 0,0  | 3,6  |      |      |

### Leguminose

|                     |    |
|---------------------|----|
| Copertura %         | 15 |
| Rispetto cop.totale | 15 |

|                               |     |     |     |   |   |
|-------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| <i>Onobrychis viciifolia</i>  | 3   | 5   | 3   | > | 4 |
| <i>Lotus gr. corniculatus</i> | 4   | 3   | 2   |   |   |
| <i>Trifolium montanum</i>     | 3   | 3   | 3   |   |   |
| <i>Trifolium pratense</i>     | 2,5 | 4   | 4   |   |   |
| <i>Genista tinctoria</i>      | 4   | 5   | 0   | < |   |
|                               | 6,6 | 8,0 | 4,8 |   |   |

### Altre specie

|                     |    |
|---------------------|----|
| Copertura %         | 25 |
| Rispetto cop.totale | 25 |

|                                  |     |     |     |   |  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|---|--|
| <i>Rhinanthus alectorolophus</i> | 1   | 4   | 0   |   |  |
| <i>Salvia pratensis</i>          | 4   | 5   | 1   |   |  |
| <i>Ranunculus acris</i>          | 1,5 | 4   | 0   |   |  |
| <i>Galium verum</i>              | 3   | 4   | 0   |   |  |
| <i>Scabiosa gr. columbaria</i>   | 3,5 | 5   | 0   |   |  |
| <i>Centaurea nigrescens</i>      | 4   | 5   | 0   |   |  |
| <i>Filipendula vulgaris</i>      | 2   | 5   | 0   |   |  |
| <i>Helianthemum nummularium</i>  | 3   | 3   | 0   |   |  |
| <i>Hypochaeris maculata</i>      | 4,5 | 5   | 1   | < |  |
| <i>Leucanthemum vulgare</i>      | 2   | 5   | 0   | < |  |
|                                  | 5,7 | 9,0 | 0,4 |   |  |

INDICI **5,3** **6,9** **3,0**

NOTE: in agosto per la sagra il prato viene sfalcato