

SCHEDA RILIEVO SPEDITIVO PRATI DONATORI

Serie/Progetto **GEBIODIV – WP3 e WP4**
 Compilatore **Magillo Francesca**

Stazione **MBIGN**
 Data **21/06/22**

LOCALIZZAZIONE E ACCESSO

Quota (m) **1250**
 Asfalto
 Sterrata **1,2km**
 Pista trattabile **300m**
 Sentiero

Comune **Sanremo**
 Località **Monte Bignone**
 Stima estensione **1000-5000 mq**
 Qualità accesso **Ottima**
 Proprietà **Privata**

CARATTERISTICHE GENERALI

Alt.erbe (cm) **50**
 Copertura % **90**
 Tare rocce/pietre **0**
 Tare terra/muschi **10**
 Pendenza **25**
 Esposizione **N/NE**

Tipo vegetazione **Prato**
 Facies pastorale **19.13 Festuca gr. ovina**
 Habitat Natura2000 **6210 (possibile prioritario)**
 Specie emergenti **Anacamptis morio**
 Specie problematiche
 Litologia **Flysch calcareo-marnosi**

SPECIE PREVALENTI

Graminoidi

Copertura % **60**
 Rispetto cop.totale **67**

	STAB	FIOR	ISVP	Abb.	Ord.
<i>Festuca ovina s.l.</i>	3	0	1,5	>	1
<i>Bromopsis erecta (=Bromus erectus)</i>	3	0	1,5		2
<i>Bromus hordeaceus</i>	1,5	0	0		4
<i>Carex caryophyllea</i>	1	0	0		
<i>Briza media</i>	1,5	0	1	<	
	4,0	0,0	1,6		

Leguminose

Copertura % **10**
 Rispetto cop.totale **11**

<i>Vicia gr. cracca</i>	3	4	1		3
<i>Ononis spinosa</i>	4	4	0		
<i>Lotus gr. corniculatus</i>	4	3	2		
<i>Trifolium montanum</i>	3	3	3		
<i>Trifolium campestre</i>	1,5	1	1		
	6,2	6,0	2,8		

Altre specie

Copertura % **20**
 Rispetto cop.totale **22**

<i>Cynanchica aristata (=Asperula cynan)</i>	2,5	2	0		5
<i>Teucrium chamaedrys</i>	4	2	0		
<i>Helianthemum nummularium</i>	3	3	0		
<i>Pilosella officinarum (=Hieracium pilos)</i>	2	3	0		
<i>Poterium sanguisorba (=Sanguisorba)</i>	4	2	1		
<i>Galium verum</i>	3	4	0		
<i>Centaurea jacea</i>	4	4	0		
<i>Knautia arvensis</i>	3,5	5	1		
<i>Potentilla verna (=neumanniana)</i>		3	0	<	
<i>Thymus gr. serpyllum</i>	2	3	0	<	
	6,2	6,2	0,4		

INDICI **4,7** **4,0** **1,5**

NOTE: il sito è stato oggetto di altri rilievi nell'ambito del progetto (Dott.ssa Turcato), con le stesse conclusioni per quanto riguarda la facies pastorale e l'habitat Natura2000. Il rilievo è stato effettuato nell'area recintata con pastore elettrico; nelle altre zone il cotico risultava bassissimo e soggetto a intenso calpestio.